Листок-вкладыш – информация для пациента
Армадин® лонг, 375 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
Армадин® лонг, 750 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
Действующее вещество: этилметилгидроксипиридина сукцинат

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.
Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
Содержание листка-вкладыша
1. Что из себя представляет препарат Армадин® лонг, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Армадин® лонг.
3. Прием препарата Армадин® лонг.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Армадин® лонг.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Армадин® лонг, и для чего его применяют

Препарат Армадин® лонг содержит действующее вещество этилметилгидроксипиридина сукцинат, которое относится к группе «другие препараты для лечения нервной системы, прочие препараты для лечения нервной системы». Этилметилгидроксипиридина сукцинат оказывает защитное действие на мембраны клеток и является антиоксидантом – веществом, обезвреживающим потенциально вредные химические вещества, называемые свободными радикалами. Свободные радикалы могут причинить вред, если они образуются неконтролируемым образом (например, при болезни).
Показания к применению
Препарат Армадин® лонг применяется у взрослых в возрасте от 18 лет при:
- последствиях острых нарушений мозгового кровообращения (при инсульте), в т.ч. после кратковременного нарушения мозгового кровообращения (транзиторных ишемических атак), в фазе нарушения функционирования организма (субкомпенсации) в качестве профилактических курсов;
- легкой черепно-мозговой травме, последствиях черепно-мозговых травм;
- энцефалопатии различного генеза (нарушение функции мозга из-за проблем с его кровоснабжением) (дисциркуляторные, дисметаболические, посттравматические, смешанные);
- нарушении нервной регуляции работы внутренних органов (синдроме вегетативной

дистонии);
- легких умственных (когнитивных) нарушениях, возникающих из-за атеросклероза сосудов (разрастания холестериновых бляшек на стенках сосудов, которые закрывают их просвет и мешают току крови);
- тревожных расстройствах при невротических и неврозоподобных состояниях;
- ишемической болезни сердца в составе комплексной терапии;
- комплексе жалоб, которые возникают при отказе от употребления спиртных напитков у страдающих алкоголизмом людей (абстинентный синдром);
- остром отравлении (интоксикации) препаратами, которые принимают при лечении психических заболеваний (антипсихотическими средствами);
- состояниях с повышенной утомляемостью (астенических состояниях), а также для профилактики развития заболеваний внутренних органов (соматических заболеваний) под воздействием экстремальных факторов и нагрузок;
- воздействии экстремальных (стрессорных) факторов.

Способ действия препарата Армадин® лонг

Этилметилгидроксипиридина сукцинат оказывает защитное действие на мембраны клеток и является антиоксидантом – веществом, обезвреживающим потенциально вредные химические вещества, называемые свободными радикалами. Свободные радикалы могут причинить вред, если они образуются неконтролируемым образом (например, при болезни). Также препарат оказывает противосудорожное, успокаивающее действие, повышает устойчивость организма к стрессу и к патологическим состояниям, которые возникают при недостатке кислорода в органах и тканях организма. Также помогает замедлить развитие атеросклероза сосудов (разрастания холестериновых бляшек на стенках сосудов, которые закрывают их просвет и мешают току крови).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Армадин® лонг

Противопоказания

Не принимайте препарат Армадин® лонг:

- если у Вас аллергия на этилметилгидроксипиридина сукцинат или другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас есть острые нарушения функции печени;
- если у Вас есть острые нарушения функции почек;
- если Вы беременны;
- если Вы кормите грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Армадин® лонг проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы принимаете успокоительные (транквилизирующие), антипсихотические (нейролептические), антидепрессивные, снотворные или противосудорожные средства.

Дети и подростки

Не давайте препарат Армадин® лонг детям в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку безопасность и эффективность не установлены.

Другие препараты и препарат Армадин® лонг

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Это особенно важно, если Вы принимаете:

- противоэпилептические препараты (например, карбамазепин);
- транквилизаторы (успокоительные, противотревожные средства – например, феназепам, диазепам);
- средства для лечения болезни Паркинсона (например, леводопа);
- нитратсодержащие препараты.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели или планируете беременность, перед началом приема препарата Армадин® лонг проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Не принимайте препарат Армадин® лонг в период беременности.

Не принимайте препарат Армадин® лонг в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

В период приема препарата Армадин® лонг соблюдайте осторожность при работе, которая требует быстроты психофизических реакций (управление транспортными средствами, работа с механизмами).

3. Прием препарата Армадин® лонг

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Дозы и длительность лечения назначают с учетом чувствительности пациентов к препарату и медицинских показаний.

Рекомендуемая доза

Принимают по назначению врача по 1 таблетке 375 мг или 750 мг 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза – 750 мг.

Путь и (или) способ введения

Таблетки принимайте внутрь независимо от приема пищи, не разламывайте и не разжевывайте, запивайте водой.

Продолжительность терапии

Длительность лечения – 2-6 недель; для купирования алкогольной абстиненции – 5-7 дней.

Продолжительность курса терапии у пациентов с ишемической болезнью сердца не менее 6-8 недель.

Повторные курсы (по рекомендации врача) желательно проводить в весенне-осенние периоды.

Если Вы приняли препарата Армадин® лонг больше, чем следовало

В связи с низкой токсичностью препарата Армадин® лонг передозировка маловероятна. При приеме препарата в высоких дозах возможно развитие нарушения сна (бессонница,

в некоторых случаях – сонливость).
Указанные симптомы обычно не требуют лечения и исчезают самостоятельно. При выраженных проявлениях проводится поддерживающее и симптоматическое лечение.

Если Вы забыли принять препарат Армадин® лонг

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную таблетку.

Если Вы прекратили прием препарата Армадин® лонг

Перед прерыванием или прекращением лечения препаратом Армадин® лонг предварительно обсудите это с лечащим врачом.
При наличии вопросов по приему препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Армадин® лонг может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможно развитие тяжелых нежелательных реакций, которые наблюдались очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000).

Немедленно сообщите врачу, если заметите появление следующих симптомов:

- отек слизистых оболочек и подкожной клетчатки, особенно в области лица и шеи, одышка, затруднение дыхания (признаки ангионевротического отека);
- кожный зуд и высыпания на коже в виде волдырей (крапивница).

Возможно развитие других нежелательных реакций, которые наблюдались очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

- сонливость;
- головная боль;
- сухость во рту;
- тошнота;
- боль, жжение и дискомфорт в животе;
- изжога;
- повышенное газообразование (метеоризм);
- диарея (жидкий стул);
- гиперемия кожи (покраснение).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства-члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550 99 03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://roszdravnadzor.gov.ru/

5. Хранение препарата Армадин® лонг

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного в маркировке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 30 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Армадин® лонг содержит:

Действующим веществом является этилметилгидроксипиридина сукцинат.

Армадин® лонг, 375 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой.

Каждая таблетка содержит 512,3 мг гранул этилметилгидроксипиридина сукцината, в пересчете на этилметилгидроксипиридина сукцинат 375 мг.

Армадин® лонг, 750 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой.

Каждая таблетка содержит 1024,5 мг гранул этилметилгидроксипиридина сукцината, в пересчете на этилметилгидроксипиридина сукцинат 750 мг.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), янтарная кислота, магния стеарат, поливиниловый спирт, макрогол 4000, титана диоксид, тальк.

Внешний вид препарата Армадин® лонг и содержимое его упаковки

Армадин® лонг, 375 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой.

Таблетки круглые двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета. Допускается наличие слабого характерного запаха.

Армадин® лонг, 750 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой.

Таблетки овальные двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета. Допускается наличие слабого характерного запаха.

10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной или пленки поливинилхлоридной/поливинилиденхлоридной и фольги алюминиевой.

10, 20, 25, 30 или 40 таблеток в банке из полиэтилентерефталата или банке полипропиленовой, укупоренной крышкой из полиэтилена высокого давления с контролем первого вскрытия, или крышкой полипропиленовой с системой «нажать-повернуть», или крышкой из полиэтилена низкого давления с контролем первого вскрытия.

Допускается свободное пространство в банке заполнять ватой медицинской гигроскопической.
1, 2, 3 или 4 контурных ячейковых упаковок или одна банка вместе с листком-вкладышем в картонной упаковке (пачке).
Не все виды упаковок могут быть доступны для реализации.

Держатель регистрационного удостоверения

Венгрия
ОАО «Гедеон Рихтер»
Gedeon Richter Plc.
1103 Gyomroi st. 19-21, Budapest, Hungary

Производитель (выпускающий контроль качества)

Россия
ООО НПО «ФармВИЛАР», 249096, Калужская обл., Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Коммунистическая, д. 115.
Россия
ООО «Озон», Самарская обл., г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6.
Россия
ООО «Фармамед», г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, ул. Домостроительная, д. 16, лит. Е.

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:
Российская Федерация
Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия) г. Москва
Адрес: 119049, г. Москва, 4-й Добрынинский пер., дом 8
Телефон: +7 495 987-15-55
Электронная почта: drugsafety@g-richter.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

03/2026

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза http://eec.eaeunion.org/

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Армадин лонг, 375 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой.

Армадин лонг, 750 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой.

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующее вещество: этилметилгидроксипиридина сукцинат.

Армадин лонг, 375 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 512,3 мг гранул этилметилгидроксипиридина сукцината, в пересчете на этилметилгидроксипиридина сукцинат 375 мг.

Армадин лонг, 750 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 1024,5 мг гранул этилметилгидроксипиридина сукцината, в пересчете на этилметилгидроксипиридина сукцинат 750 мг.

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой.

Армадин лонг, 375 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Таблетки круглые двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета. Допускается наличие слабого характерного запаха.

Армадин лонг, 750 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Таблетки овальные двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета. Допускается наличие слабого характерного запаха.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

Препарат Армадин лонг показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет при:

– последствиях острых нарушений мозгового кровообращения, в том числе после транзиторных ишемических атак, в фазе субкомпенсации в качестве профилактических курсов;

– легкой черепно-мозговой травме, последствиях черепно-мозговых травм;

– энцефалопатии различного генеза (дисциркуляторные, дисметаболические, посттравматические, смешанные);
– синдроме вегетативной дистонии;
– легких когнитивных расстройствах атеросклеротического генеза;
– тревожных расстройствах при невротических и неврозоподобных состояниях;
– ишемической болезни сердца в составе комплексной терапии;
– купировании абстинентного синдрома при алкоголизме с преобладанием неврозоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств, постабстинентных расстройств;
– состоянии после острой интоксикации антипсихотическими средствами;
– астеническом состоянии, а также для профилактики развития соматических заболеваний под воздействием экстремальных факторов и нагрузок;
– воздействии экстремальных (стрессорных) факторов.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

Дозы и длительность лечения назначают с учетом чувствительности пациентов к препарату и медицинских показаний.

Принимают по назначению врача по 1 таблетке 375 мг или 750 мг 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза – 750 мг.

Длительность лечения – 2-6 недель; для купирования алкогольной абстиненции – 5-7 дней.

Продолжительность курса терапии у пациентов с ишемической болезнью сердца не менее 6-8 недель.

Повторные курсы (по рекомендации врача) желательно проводить в весенне-осенние периоды.

Дети

Безопасность и эффективность препарата Армадин лонг у детей и подростков в возрасте до 18 лет на данный момент не установлены. Данные отсутствуют.

Способ применения

Таблетки Армадин лонг следует принимать внутрь независимо от приема пищи, не разламывая и не разжевывая, запивая водой.

4.3. Противопоказания

– гиперчувствительность к этилметилгидроксипиридина сукцинату или к любому из

вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1.;

- острые нарушения функции печени;
- острые нарушения функции почек;
- беременность (см. раздел 4.6.);
- лактация (см. раздел 4.6.).

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

Под влиянием этилметилгидроксипиридина сукцината усиливается действие транквилизирующих, нейролептических, антидепрессивных, снотворных и противосудорожных средств, что позволяет снизить их дозы и уменьшить побочные эффекты (см. раздел 4.5.).

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Препарат сочетается со всеми препаратами, используемыми для лечения соматических заболеваний.

Усиливает действие бензодиазепиновых препаратов, антидепрессантов, анксиолитиков, противоэпилептических средств (карбамаземина) и противопаркинсонических средств (леводопы), нитратсодержащих препаратов.

Уменьшает токсическое действие этанола.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Беременность

Применение препарата Армадин лонг во время беременности противопоказано.

Лактация

Применение препарата Армадин лонг в период лактации противопоказано.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

В период применения препарата Армадин лонг следует соблюдать осторожность при работе, требующей быстроты психофизических реакций (управление транспортными средствами, механизмами и т.п.).

4.8. Нежелательные реакции

Резюме нежелательных реакций

Частота встречаемости определяется в соответствии с классификацией Всемирной Организации Здравоохранения следующим образом: очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100, но <1/10); нечасто (≥ 1/1000, но <1/100); редко (≥ 1/10000, но <1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Нарушения со стороны иммунной системы

Очень редко – ангионевротический отек, крапивница.

Психические нарушения

Очень редко – сонливость.

Нарушения со стороны нервной системы

Очень редко – головная боль.

Желудочно-кишечные нарушения

Очень редко – сухость во рту, тошнота, боль, жжение и дискомфорт в эпигастральной области, изжога, метеоризм, диарея.

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей

Очень редко – зуд, сыпь, гиперемия.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.
Телефон: +7 (800) 550 99 03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт: https://roszdravnadzor.gov.ru/

4.9. Передозировка

Симптомы

Сонливость, бессонница.

Лечение

В связи с низкой токсичностью передозировка маловероятна. Лечение, как правило, не требуется – симптомы исчезают самостоятельно в течение суток. При выраженных проявлениях проводится поддерживающее и симптоматическое лечение.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: другие препараты для лечения нервной системы,

прочие препараты для лечения нервной системы.

Код АТХ: N07XX

Механизм действия

Механизм действия этилметилгидроксипиридина сукцината обусловлен его антиоксидантным, антигипоксантным и мембранопротекторным действием. Он ингибирует процессы перекисного окисления липидов, повышает активность супероксиддисмутазы, повышает соотношение липид-белок, улучшает структуру и функцию мембраны клеток. Модулирует активность мембраносвязанных ферментов (кальций-независимой фосфодиэстеразы, аденилатциклазы, ацетилхолинэстеразы), рецепторных комплексов (бензодиазепинового, гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), ацетилхолинового), что усиливает их способность связывания с лигандами, способствует сохранению структурно-функциональной организации биомембран, транспорта нейромедиаторов и улучшению синаптической передачи. Этилметилгидроксипиридина сукцинат повышает содержание дофамина в головном мозге. Вызывает усиление компенсаторной активности аэробного гликолиза и снижение степени угнетения окислительных процессов в цикле Кребса в условиях гипоксии с увеличением содержания аденозинтрифосфата (АТФ), креатинфосфата и активацией энергосинтезирующих функций митохондрий, стабилизацию клеточных мембран.

Фармакодинамические эффекты

Этилметилгидроксипиридина сукцинат относится к классу 3-оксипиридинов. Является ингибитором свободнорадикальных процессов, мембранопротектором, обладающим антигипоксическим, стресс-протекторным, ноотропным, противоэпилептическим и анксиолитическим действием. Препарат повышает резистентность организма к воздействию различных повреждающих факторов при патологических состояниях (гипоксии и ишемии, нарушении мозгового кровообращения, интоксикации этанолом и антипсихотическими средствами).

В условиях критического снижения коронарного кровотока способствует сохранению структурно-функциональной организации мембран кардиомиоцитов, стимулирует активность мембранных ферментов – фосфодиэстеразы, аденилатциклазы, ацетилхолинэстеразы. Поддерживает развивающуюся при острой ишемии активацию аэробного гликолиза и способствует в условиях гипоксии восстановлению митохондриальных окислительно-восстановительных процессов, увеличивает синтез АТФ и креатинфосфата. Обеспечивает целостность морфологических структур и физиологических функций ишемизированного миокарда. Улучшает клиническое

течение инфаркта миокарда, повышает эффективность проводимой терапии, снижает частоту возникновения аритмий и нарушений внутрисердечной проводимости. Нормализует метаболические процессы в ишемизированном миокарде, повышает антиангинальную активность нитратов, улучшает реологические свойства крови, уменьшает последствия реперфузионного синдрома при острой коронарной недостаточности.

Уменьшает ферментативную токсемию и эндогенную интоксикацию при остром панкреатите.

Этилметилгидроксипиридина сукцинат улучшает метаболизм и кровоснабжение головного мозга, улучшает микроциркуляцию и реологические свойства крови, уменьшает агрегацию тромбоцитов. Стабилизирует мембранные структуры клеток крови (эритроцитов и тромбоцитов), снижая вероятность развития гемолиза. Оказывает гиполипидемическое действие, уменьшает содержание общего холестерина и липопротеидов низкой плотности.

Антистрессорное действие проявляется в нормализации постстрессового поведения, соматовегетативных нарушений, восстановлении циклов сон-бодрствование, нарушенных процессов обучения и памяти, снижении дистрофических и морфологических изменений в различных структурах головного мозга.

Этилметилгидроксипиридина сукцинат обладает выраженным антитоксическим действием при абстинентном синдроме. Он устраняет неврологические и нейротоксические проявления острой алкогольной интоксикации, восстанавливает нарушения поведения, вегетативные функции, а также способен снимать когнитивные нарушения, вызванные длительным приемом этанола и его отменой. Под влиянием препарата усиливается действие транквилизирующих, нейролептических, антидепрессивных, снотворных и противосудорожных средств, что позволяет снизить их дозы и уменьшить побочные эффекты.

Этилметилгидроксипиридина сукцинат улучшает функциональное состояние ишемизированного миокарда. В условиях коронарной недостаточности увеличивает коллатеральное кровоснабжение ишемизированного миокарда, способствует сохранению целостности кардиомиоцитов и поддержанию их функциональной активности. Эффективно восстанавливает сократимость миокарда при обратимой сердечной дисфункции.

5.2. Фармакокинетические свойства

Абсорбция

Армадин лонг – пролонгированная лекарственная форма, которая обеспечивает равномерное суточное высвобождение действующего вещества в течение 20 часов и снижает вероятность возникновения побочных эффектов в результате резкого повышения его содержания в плазме крови. После приема натощак препарата Армадин лонг – среднее значение максимального времени (t_{max}) этилметилгидроксипиридина сукцината составляет 1,56 часа, прием пищи несколько замедляет абсорбцию этилметилгидроксипиридина сукцината – среднее значение t_{max} составляет 3,08 часа. Всасывание препарата начинается в желудке и происходит в тонком и толстом кишечнике. Скорость высвобождения и абсорбции этилметилгидроксипиридина сукцината из таблеток Армадин лонг практически не зависит от отдела желудочно-кишечного тракта, pH и состава химуса.

Биотрансформация

Этилметилгидроксипиридина сукцинат в организме человека метаболизируется, главным образом, в печени путем интенсивной конъюгации с глюкуроновой кислотой и выводится с мочой как в неизмененном виде, так и в виде глюкуронконъюгатов. Идентифицировано 5 метаболитов: 3-оксипиридина фосфат – образуется в печени, при участии щелочной фосфатазы распадается на фосфорную кислоту и 3-оксипиридин; 2-й метаболит – фармакологически активный, образуется в больших количествах и обнаруживается в моче на 1-2 сутки после введения; 3-й – выводится в больших количествах с мочой; 4-й и 5-й – глюкуронконъюгаты.

Элиминация

Средний период полувыведения ($T_{1/2}$) этилметилгидроксипиридина сукцината после приема натощак препарата Армадин лонг – составляет 5,24 часа, в условиях после приема пищи – 3,86 часа. Быстро выводится с мочой в основном в виде метаболитов и в незначительном количестве – в неизменном виде. Показатели выведения с мочой неизмененного этилметилгидроксипиридина сукцината и метаболитов имеют индивидуальную вариабельность.

5.3. Данные доклинической безопасности

В доклинических данных, полученных по результатам стандартных исследований фармакологической безопасности препарата Армадин лонг, токсичности при многократном введении, генотоксичности, канцерогенного потенциала и репродуктивной и онтогенетической токсичности, особый вред для человека не выявлен.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза)

Янтарная кислота

Магния стеарат

Поливиниловый спирт

Макрогол 4000

Титана диоксид

Тальк

6.2. Несовместимость

Не применимо.

6.3. Срок годности (срок хранения)

3 года.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 30 °С.

6.5. Характер и содержание первичной упаковки

Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 375 мг или 750 мг.

10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной или пленки поливинилхлоридной/поливинилиденхлоридной и фольги алюминиевой.

10, 20, 25, 30 или 40 таблеток в банке из полиэтилентерефталата или банке полипропиленовой, укупоренной крышкой из полиэтилена высокого давления с контролем первого вскрытия, или крышкой полипропиленовой с системой «нажать-повернуть», или крышкой из полиэтилена низкого давления с контролем первого вскрытия.

Допускается свободное пространство в банке заполнять ватой медицинской гигроскопической.

1, 2, 3 или 4 контурных ячейковых упаковок или одна банка вместе с листком-вкладышем в картонную упаковку (пачку).

Не все виды упаковок могут быть доступны для реализации.

6.6. Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата, и другие манипуляции с препаратом

Нет особых требований к утилизации.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Венгрия

ОАО «Гедеон Рихтер»

1103 Будапешт, ул. Дёмрёи, 19-21

7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения

Претензии потребителей направлять по адресу

Российская Федерация

Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия) г. Москва

Адрес: 119049, г. Москва, 4-й Добрынинский пер., дом 8

Телефон: +7 495 987-15-55

Электронная почта: drugsafety@g-richter.ru

8. НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

ЛП-№(007268)-(РГ-RU)

9. ДАТА ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ)

Дата первой регистрации:

15.10.2024

10. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА

03/2026

Общая характеристика лекарственного препарата Армадин лонг доступна на информационном портале Евразийского экономического союза в информационно-коммуникационной сети «Интернет» http://eec.eaeunion.org/